統合失調症—今こそ政策の変革に注力を

統合失調症に関する洞察を明らかにし、画期的な変革を先導：世界的な行動の呼びかけ

統合失調症について理解する

以下を特徴とする
精神障害¹：

- 異常な思考
- 知覚の障害
- 乏しいまたは過度の情動表出
- 会話の減少
- 精神運動異常

全世界で約 2400 万
人が罹患している¹

遺伝的要因、非遺伝的
要因および生物学的要
因の、複雑な相互作用
が原因である¹

大概是成人期初期に
発症し、一生を通じて
負担をもたらす¹

患者と介護者の生活
の質に影響を及ぼす¹

余命が最大で
20 年短縮する²

統合失調症はあらゆる
精神疾患の中で、
社会経済的な影響が
最も大きい³

政策と人権

地域に根差したケア、尊厳、自律、
非強制的治療を提唱することが
重要である⁴

ケアの進歩

薬物療法や診断法の飛躍的進歩か
ら、地域密着型ケアやデジタルヘル
スのイノベーションに至るまで、統
合失調症の治療は改善しつつある⁴

さらにできること

早期発見、介護者に対する支援の強
化、デジタルヘルスの活用、社会的お
よび職業的包摂の育成が、より明るい
未来への鍵となる⁴

できることから始めよう！

どんなに小さな変化やイニシアチブ
でも、状況を改善する可能性がある

参考文献

1. World Health Organization. Schizophrenia. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia> (Accessed March 2024).
2. Laursen TM *et al.*, Excess early mortality in schizophrenia. *Annu Rev Clin Psychol.* 2014;10:425-48. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-032813-153657. Epub 2013 Dec 2. PMID: 24313570.
3. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Psychiatry* 2022;9(2):137-150. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00395-3. PMID: 35026139; PMCID: PMC8776563.
4. Galderisi S, *et al.*, Schizophrenia - Time to Commit to Policy Change. Available at: <https://www.oxfordhealthpolicyforum.org/wp-content/uploads/2024/01/Schizophrenia-Time-to-Commit-to-Policy-Change-Updated-Report-2024.pdf> (Accessed March 2024)

統合失調症のケアと政策の
両方をいかにして変革でき
るかを探るため、是非とも提
言書の全文を、右の QR コー
ドからご覧いただきたい。

統合失調症患者の経験は一人ひとり異なるが、各段階で一部の人が経験しうる事柄のいくつかの例を以下に挙げる。

前精神病段階		精神病の初回エピソード		診断		初期治療		再発-回復のサイクル		ニューノーマル	
患者	介護者	患者	介護者	患者	介護者	患者	介護者	患者	介護者	患者	介護者
まともでない思考や会話認められる、孤立する、常軌を逸した行動を始める場合がある。	介護者は、症状が悪化して精神病の初回エピソードが発覚するまでは、これが「正常な行動」だと思っていることが多い。	陽性症状が発覚することが多く、そのため入院を余儀なくされる。双極症/うつ病と誤診されることがよくある。	受診が必要であることに、介護者が最初に気づき始める。	診断に関する患者の経験は患者自身の受容度次第であり、医師との関係性や、精神科初回エピソード後の診断が早期か遅延するかに影響される。	この時点で介護者はより積極的になり、予約した診療時に付き添う場合もある。	初期治療の成否は、治療と自らの状態に対する患者の姿勢に大きく影響される。	介護者は解決の望みを抱くようになり、「治療」を期待することも多い。病状について気づき始める。	維持療法に慣れ始めるが、病識の欠如、コンプライアンス不良または薬物副作用などの要因が再発を招くことがあり、精神科主治医による服薬の確認や、場合により入院も促される。	再発は介護者にとって負担が大きく、患者との関係性を損なう場合もある。	自らの状態に慣れはじめ、対処法を学ぶ場合がある。病識が低い患者では、再発のために以上の援助ができない場合もある。	介護者は継続的な支援のルーチンに慣れ始めることがあるが、これ以上の援助ができない場合もある。
ニーズと対応	学校で精神保健に対する理解を深める、精神疾患および統合失調症のステグマに対応する。親、教師およびスクールカウンセラーに対し、小児の精神疾患の徴候および症状について教育する。	ニーズと対応	精神病の前駆症状を早期に特定することで、精神科へのより速やかな紹介および早期介入につながる。	ニーズと対応	患者は診断および長期的な治療の見通しを受け入れるのに苦闘する場合がある(特に、「施設に取容された」と感じている場合)。	ニーズと対応	患者と当該の介護者： ●患者と当該の介護者に、治療の選択に関する現実的で正確な情報、選択した治療の根拠、限界、また心理社会的要因が治療転帰にどのような影響をおよぼすかを説明すべきである。 ●患者と介護者は、回復の選択肢、回復に関する個人的な目標を明らかにし、ケアプランの策定過程に参加すべきである。	ニーズと対応	病識のレベルにもよるが、患者は維持療法に対するアドヒアランスの重要性を理解しない場合がある。 患者および介護者に対するアドヒアランスの管理戦略、トリガー、並びに再発にあたっての介護者の精神的支援を行う。 患者および介護者は、再発が差し迫っている徴候に気づかない場合がある。 医療従事者も、患者の再発を予防するのに十分な頻度で接触していなかった場合には、そうした徴候に気づかない場合がある。	ニーズと対応	生活を安定して制御された状態に至るよう、患者および介護者を支援する(患者にとって良い結果をもたらす仕事を見つけることを手伝う等)。 医療従事者は、患者の日常生活や薬物療法との関係に注力し、関心を抱き続け、加えて再発および疾患について医療従事者のさらなる教育を行う。 長期的なコンプライアンス維持の支援および再発管理の選択肢の提供。 地域社会支援-他の統合失調症患者と話す。